

# 顺产后疑似胎盘植入保守治疗成功 1 例的报道

郑德燕, 王榕娟<sup>△</sup> (南京军区福州总医院四七六医院妇产科, 福州 350008)

**【关键词】** 顺娩; 胎盘植入; 保守治疗  
**DOI:10.3969/j.issn.1672-9455.2015.18.072** 文献标志码: B 文章编号: 1672-9455(2015)18-2810-01

胎盘植入是产科严重的并发症之一, 可导致产后出血、失血性休克、感染等, 危及产妇生命, 多数需行子宫切除。但胎盘植入的患者多数是年轻女性, 有生育要求, 保留子宫的意愿强烈, 因此探索一种安全、有效的保守治疗方案意义重大。我们临床上遇见的该例疑似胎盘植入患者, 予保守治疗方案[甲氨蝶呤(MTX)、米非司酮、生化汤联合用药], 并取得满意效果。

## 1 临床资料

患者, 27 岁, G<sub>3</sub>P<sub>0</sub>, 因停经 38<sup>+</sup><sub>2</sub> 周, 阴道流液 1 h 于 2014 年 3 月 27 日入院待产, 末次月经 2013 年 7 月 1 日, 孕期顺, 定期产检, 2012 年、2013 年均孕 1<sup>+</sup> 月行无痛人流术。体格检查: 生命体征平稳, 心、肺、肝、脾未及异常, 产检: 腹围 110 cm, 宫高 34 cm, 胎位左枕前(LOA), 偶有宫缩, 先露头, 胎心 145 次/分。阴查: 宫口未开, 未触及水囊感, 先露 S-3, 见清亮羊水流。入院 B 超提示羊水指数 4.6 cm, 胎盘位于右侧壁+宫底, 厚度 4.41 cm。3 月 27 日 13:49 顺娩一活男婴, 分娩后 30 min 胎盘未娩出, 行徒手人工剥离胎盘术, 术中感胎盘与子宫粘连紧密, 剥离部分胎盘组织, 查床边 B 超提示右宫底肌壁间一 7.28 cm×7.01 cm×7.21 cm 高回声团块, 疑胎盘植入。停止手术操作, 手术过程中及术后阴道出血少。产后第 3 天查血人绒毛膜促性腺激素(β-HCG) 1 471 U/L, 复查彩超提示右宫底腔一 7.35 cm×7.26 cm×7.44 cm 高回声团块, 考虑胎盘植入。患者阴道出血少, 有生育要求, 即行药物保守治疗: 甲氨蝶呤(1 mg/kg, 肌肉注射, 隔天 1 次, 2 次为一疗程, 行 3 个疗程) 联合米非司酮(50 mg, 口服, 2 次/d), 同时服用生化汤(当归 15 g, 川芎 10 g, 桃仁 10 g, 炮姜 3 g, 丹参 15 g, 益母草 30 g, 甘草 4.5 g, 薏米 30 g, 枳壳 10 g, 煎服, 2 次/d)。用药过程中未出现药物不良反应。

产后第 43 天复查血 β-HCG 5 U/L。产后 118 d 患者突然下腹剧痛, 伴发热, 最高体温 38.9 ℃, 查体: 心肺无异常, 下腹部压痛, 无反跳痛。妇科检查: 外阴、阴道正常, 宫口 4 cm, 见组织嵌顿, 无阴道出血。数分钟后自行排出一 9.5 cm×4.5 cm×4.9 cm 组织, 质韧, 色淡红, 如熟肉。组织排出后腹痛缓解, 体温逐渐正常。复查彩超提示右宫底腔近宫角处探及范围约 1.94 cm×1.07 cm×2.35 cm 不均质高回声。将组织送病

理检查, 提示广泛变性、坏死、钙化的胎盘组织。组织盘排出后 3 个月余月经来潮, 复查 B 超提示子宫正常大小, 未探及异常回声, 右宫底肌层最薄处厚 0.82 cm。

## 2 讨论

胎盘植入是严重产科并发症之一, 可导致产后出血、失血性休克、感染, 危及产妇生命, 多数需立即切除子宫。胎盘植入的发生率国内报道各异, 国内文献报道其发生率为 0.23%~0.30%, 国外文献报道发生率为 1/2 500, 近年来, 随着人流、药流、引产、剖宫产的增加, 胎盘植入发病率明显上升<sup>[1-4]</sup>。但此人群多数是年轻女性, 有生育要求, 保留子宫的保守治疗意义重大。该例患者存在高危因素, 如 2 次无痛人流史, 分娩后胎盘未娩出, 且徒手人工剥离胎盘困难, 超声提示疑似胎盘植入, 但顺产后阴道出血不多, 具备保守治疗的条件, 积极选择该治疗方案, 且最终效果显著<sup>[5]</sup>。对于类似患者可考虑先保守治疗, 但需密切观察阴道出血情况, 监测 β-HCG 下降及肝肾功能, 如治疗失败或无效再行手术治疗。但对于产后出血、失血性休克患者, 应以手术治疗为主, 积极抢救, 挽救生命。

## 参考文献

[1] 张晓群. 超声对 9 例植入性胎盘的诊断及分析[J]. 中华现代妇产科学杂志, 2010, 4(1): 12.  
[2] Pinho S, Sarzedas S, Pedroso S, et al. Partial placenta in-creta and methotrexate therapy: three case reports [J]. Clin Exp Obstet Gynecol, 2008, 35(3): 221-224.  
[3] 谢幸, 苟文丽. 妇产科学[M]. 8 版. 北京: 人民卫生出版社, 2013: 126.  
[4] 李玉霞. 前置胎盘、胎盘粘连、胎盘植入与人工流产的相关性研究[J]. 世界最新医学信息文摘, 2014, 14(21): 89-90.  
[5] 屠京慧, 李莹. 胎盘植入保守治疗的临床分析[J]. 中国全科医学, 2014, 17(18): 2139-2141.

(收稿日期: 2015-02-25 修回日期: 2015-03-18)

<sup>△</sup> 通讯作者, E-mail: 200302138@163.com.

