快速检测金黄色葡萄球菌环介导等温扩增方法的建立与评价*

欧红玲, 陈凤华, 王 岩, 张巧云, 贾连玲, 李雪丽, 孙建华, 王欣茹[△] (第二炮兵总医院检验科, 北京 100088)

【摘要】 目的 探讨环介导等温扩增技术(LAMP)作为快速检测方法对金黄色葡萄球菌快速检测的可行性和可靠性。**方法** 建立 LAMP 反应体系, 优化反应条件, 进行灵敏度和特异度试验。**结果** 筛选出了 LAMP 反应检测金黄色葡萄球菌 *nuc* 基因的最佳引物组, 最佳反应温度为 62 °C, LAMP 和 PCR 检测 *nuc* 基因的最低检测限分别为 1.47、14.7 pg/ μ L, 检测金黄色葡萄球菌的特异性为 100%。**结论** LAMP 具有操作简单、敏感度高、特异性强的特点, 能够满足基层实验室、应急检测或现场检测等方面的使用需求。

【关键词】 环介导等温扩增技术; 金黄色葡萄球菌; 快速检测

DOI: 10.3969/j.issn.1672-9455.2015.20.016 文献标志码: A 文章编号: 1672-9455(2015)20-3012-03

Establishment and evaluation of a rapid method for detection of *Staphylococcus aureus* by loop-mediated isothermal amplification* OU Hong-ling, CHEN Feng-hua, WANG Yan, ZHANG Qiao-yun, JIA Lian-ling, LI Xue-li, SUN Jian-hua, WANG Xin-ru[△] (Department of Clinical Laboratory, Second Artillery General Hospital of PLA, Beijing 100088, China)

【Abstract】 Objective To investigate the feasibility and reliability of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) in rapid detection of *Staphylococcus aureus* as a rapid detection method. **Methods** LAMP reaction system was established, the reaction conditions was optimized, the sensitivity and specificity experiments were carried out. **Results** The best primer set was selected to detect *Staphylococcus aureus* for *nuc* genes through LAMP reaction. The best reaction temperature selected was 62 °C, and the lowest detectable limits of LAMP and PCR for *nuc* genes were 1.47, 14.7 pg/ μ L respectively. The specificities of two methods to detect *Staphylococcus aureus* were 100%. **Conclusion** LAMP detection method is simple, safe operation, with high sensitivity and high specificity, which can meet the need of grassroots laboratory, emergency detection and on-site testing and other aspects.

【Key words】 loop-mediated isothermal amplification (LAMP); *Staphylococcus aureus*; rapid detection

金黄色葡萄球菌属于葡萄球菌属, 广泛分布于空气和水中, 是一种条件致病菌, 也是引起院内感染的常见微生物, 可引起化脓、败血症、脓毒症等严重并发症^[1-2]。但是目前对于怀疑金黄色葡萄球菌的患者, 检测标本以明确病原菌和耐药性的所需时间一般为 3~5 d, 在此之前的抗菌药物治疗只能凭经验用药, 所以迫切地需要一种能快速、准确地确定是否为金黄色葡萄球菌的检测方法。环介导等温扩增技术(LAMP)是 2000 年日本荣研会社的 Notomi 等^[3]开发出来的一种 DNA 恒温扩增方法, 具有高特异性、高灵敏性、简便、快速和低成本的特点, 被广泛应用于包括微生物、寄生虫检测在内的诸多领域。金黄色葡萄球菌的特异性基因为 *nuc* 基因, 本研究旨在建立一种快速检测金黄色葡萄球菌的 LAMP 方法, 优化反应条件并对该方法进行评价。

1 材料与与方法

1.1 菌株来源 标准菌株 ATCC25923, 采集 2014 年 1~3 月本院送检的痰液、尿液、血液、胆汁和腹水等标本进行细菌培养。用法国梅里埃全自动细菌分析仪鉴定之后, 留取菌种备用。

1.2 仪器与试剂 LRH-250 细菌培养箱(上海一恒科学仪器有限公司)、朗普 DNA 扩增试剂盒(批号 3Z007, 荣研生物科技有限公司), LA-320 朗普浊度实时分析仪(荣研生物科技有限公司), 细菌 DNA 提取试剂盒(批号 DP302, 天根生化科技有限公司), PCR 扩增试剂盒(批号 KT201, 天根生化科技有限公司), 170-8170 凝胶成像仪(美国 Bio-rad 公司)。

1.3 方法

1.3.1 引物设计 从 NCBI 基因库下载 *nuc* 基因序列, 使用蓝谱公司 Primer Explorer Version 4 软件设计金黄色葡萄球菌特异基因 *nuc* 的 5 组引物, 每组引物均包括外引物(F3 和 B3)和内引物(FIP 和 BIP), 另外为了提高扩增效率, 对引物组还设计了多对环引物(LB 和 LF), 引物由北京奥科生物技术有限公司合成。

1.3.2 菌液制备 将标准菌株及冻存金黄色葡萄球菌菌株用牛肉汤培养增菌, 转种于血平板上, 置于 37 °C 孵箱中孵育 18~24 h。取 2~4 个复苏菌落溶于 1 mL 去离子水中制成菌液。

1.3.3 DNA 模板制备及 LAMP 扩增 按照天根试剂盒说明书离心菌液后收集沉淀加溶菌酶与蛋白酶 K 消化(37 °C, 30

* 基金项目: 全军“十二五”面上课题资助项目(CWS11J205); 军队“十二五”重大专项子课题资助项目(424135S)。

作者简介: 欧红玲, 女, 硕士, 主管技师, 主要从事分子生物学研究。 [△] 通讯作者, E-mail: wangxinru@126.com。

min), 然后加入无水乙醇和各种缓冲液抽提, 洗脱沉淀得到纯化的 DNA, 提取的 DNA 保存于 -20 °C 冰箱备用。LAMP 反应条件优化试验及敏感度试验选用标准菌株 DNA 作为模板, 特异度试验用临床标本菌株 DNA 作为模板。LAMP 反应体系: 根据试剂盒要求, FIP 和 BIP 各 40 pmol, F3 和 B3 各 5 pmol, LF 和 LB 各 20 pmol, Bst DNA 聚合酶 1.0 μL, 加入去离子水, 加入 2.0 μL 模板配成 25 μL 反应体系。将已配制好、分装完毕的反应管置于 Loopamp 浊度实时分析仪装置中, 在 62 °C 下恒温 55 min, 80 °C 下恒温 5 min 灭活酶终止反应。Loopamp 浊度实时分析仪记录反应中由于扩增产生的浊度 (400 nm), 并绘制浊度曲线。另外, 如果需要目测反应结果, 在反应混合液中加入 1.0 μL 目测荧光试剂, 同样配成 25 μL 反应体系, 反应结束后管内液体呈绿色, 判为阳性; 液体仍为橙色则为阴性。

1.3.4 反应条件的优化 (1) 最佳引物组的筛选: 将针对 *nuc* 基因设计的 5 组引物分别进行等温扩增, 观察反应中的浊度曲线, 以最先出现指数增加的反应为最优。确定最佳引物组后, 再将最佳引物组和不同环引物进行等温扩增, 观察浊度曲线确定最佳环引物。(2) 最佳反应温度的筛选: 反应混合液在不同反应温度 (66~65 °C) 反应 55 min, 然后 80 °C 灭活 5 min, 观察 LAMP 反应中的浊度曲线, 以最先出现指数增加的反应为最优, 确定最佳反应温度。

1.3.5 LAMP 反应的敏感度 使用 LAMP 对标准菌株经倍比稀释的 DNA 进行等温扩增, 反应前在反应液内加入 1 μL 目测荧光试剂, 反应 55 min 后 80 °C 灭活 5 min, 肉眼观察其检测效果。采用 PCR 对倍比稀释的标准菌株 DNA 进行扩增, 取 5 μL 扩增产物进行 2% 凝胶电泳, 凝胶成像仪观察结果。

2 结果

2.1 金黄色葡萄球菌最佳 LAMP 反应引物 由反应曲线 (图 1) 可见, 在 5 组引物组中, 单独使用引物组 4 效果最好, 所以引物组 4 为最佳引物组, 另外, 使用软件对引物组 4 设计出 3 对不同的环引物, 将引物组 4 和环引物组合进行等温扩增, 发现环引物 1 为最优。*nuc* 基因的最佳引物为引物组 4+环引物 1, 见表 1。

注: 1~7 为 *nuc* 基因的不同引物组, 分别表示引物组 1、引物组 2、引物组 3、引物组 4、引物组 5、引物组 4+环引物 1、引物组 4+环引物 2、引物组 4+环引物 3。

图 1 *nuc* 基因的不同引物组的反应曲线

2.2 最佳反应温度的筛选 采用不同的反应温度, 进行等温扩增, 扩增反应中的浊度曲线见图 2, 可见 60 °C 反应最好, 62 °C 和 60 °C 相比差别不是很大。在临床工作中, 常需要同时检

测 *nuc* 和 *mecA*, 在同时开展的检测耐甲氧西林金黄色葡萄球菌实验中, 筛选出的 *mecA* 的最佳反应温度为 62 °C, 因此, 本研究在 *nuc* 基因检测中也选了 62 °C 作为最佳反应温度。

表 1 *nuc* 的最佳引物序列

引物名称	引物序列 (5'~3')
<i>nuc</i> F3	AAC AGT ATA TAG TGC AAC TTC AA
<i>nuc</i> B3	CTT TGT CAA ACT CGA CTT CAA
<i>nuc</i> FIP	ATG TCA TTG GTT GAC CTT TGT ACA T-AAA TTA CAT AAA GAA CCT GCG A
<i>nuc</i> BIP	GTT GAT ACA CCT GAA ACA AAG CAT C-ATT TTT TTC GTA AAT GCA CTT GC
<i>nuc</i> LF	GTA TCA CCA TCA ATC GCT TT
<i>nuc</i> LB	GGT GTA GAG AAA TAT GGT CC

注: 1~6 分别表示 60、61、62、63、64、65 °C 条件下的浊度曲线。

图 2 不同反应温度下的扩增曲线

2.3 LAMP 反应的特异度 为了观察 LAMP 反应检测金黄色葡萄球菌的特异度, 对 20 例菌株提取的 DNA 进行 LAMP 检测, 由 LAMP 检测结果 (如图 3) 可见, 使用 LAMP 方法检测菌株 *nuc* 基因, 只有金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌菌株扩增阳性, 其余的均为阴性, 因此使用 LAMP 方法检测 *nuc* 基因来检测金黄色葡萄球菌的特异度为 100%。

注: 1~20 分别表示耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、耐甲氧西林凝固酶阴性葡萄球菌、头葡萄球菌、粪肠球菌、耐甲氧西林溶血葡萄球菌、鸢鸡肠球菌、鲍曼不动杆菌、阴沟肠杆菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、奇异变形杆菌、铜绿假单胞菌、黏质沙雷菌、金黄色葡萄球菌、嗜麦芽假单胞菌、溶血性葡萄球菌、耐甲氧西林表面葡萄球菌、路邓葡萄球菌、溶血性葡萄球菌、表皮葡萄球菌。

图 3 LAMP 反应检测 *nuc* 基因的特异性

2.4 LAMP 反应的敏感度 使用 LAMP 及 PCR 方法分别对倍比稀释的金黄色葡萄球菌 DNA 进行扩增, LAMP 反应前在每份反应液内加入 1 μL 荧光试剂羟基萘酚蓝 (HNB), 反应完

毕后肉眼观察其检测效果(图 3A);PCR 扩增产物经 2% 琼脂糖凝胶电泳后凝胶成像(图 3B)。PCR 的最低检测限为 14.7 pg/ μ L, LAMP 的最低检测限为 1.47 pg/ μ L。

注:A 为 PCR 扩增产物的凝胶成像结果;B 为 LAMP 扩增产物肉眼观察结果;M 为 DNA 标志物;1~7 分别表示浓度为 147 ng/ μ L、14.7 ng/ μ L、1.47 ng/ μ L、147 pg/ μ L、14.7 pg/ μ L、1.47 pg/ μ L、0.147 pg/ μ L 的金黄色葡萄球菌 DNA;8 为未加入金黄色葡萄球菌 DNA 的阴性对照。

图 4 PCR 及 LAMP 的敏感度

3 讨论

金黄色葡萄球菌是医院感染的重要致病菌,可以产生多种致病因子,引起肌体局部缺血和坏死或急性胃肠炎等多种机体病变。近年来随着广谱抗菌药物的大量使用,金黄色葡萄球菌引起的医院感染及社区获得性感染的比例不断增多^[4]。LAMP 是一种新型的快速、特异性强和灵敏度高的核酸扩增技术,利用 4 种相异的特异性引物识别目标基因的 6 个特定区域,在 Bst DNA 聚合酶的作用下,60~65 °C 恒温条件下进行扩增,30~60 min 后目标基因的数量能达到 10⁹~10¹⁰ 个拷贝数量级^[5-6],实现快速检测目标基因的目的。因其特异度高、灵敏度、方法简便,现已被应用于很多领域,如微生物、病毒、寄生虫的检测及动物胚胎的性别鉴定等^[7-12]。

本研究针对金黄色葡萄球菌特异 *nuc* 基因设计 LAMP 引物,并用该引物灵敏、快速地检测到金黄色葡萄球菌。整个反应过程快捷,只需要将反应混合液在恒温水浴锅或金属恒温仪 62 °C 条件下保持 60 min 即可完成反应。另外,结果判定简便,既可通过直接观察反应管内有无沉淀生成,也可在反应液中加入荧光染料,肉眼观察直接判断结果。在验证 LAMP 反应的特异度中,只有金黄色葡萄球菌可扩增出 *nuc* 基因,其他葡萄球菌及非葡萄球菌均没有扩增出来,说明 LAMP 反应通过扩增 *nuc* 基因检测金黄色葡萄球菌的特异度为 100%。PCR 和 LAMP 检测 *nuc* 基因的最低检测限分别为 14.7、1.47 pg/ μ L,说明 LAMP 的敏感度较 PCR 更高。

现在国内大多数研究者在采用 LAMP 进行检测时,往往选择对反应结果进行电泳或者在反应完成后添加 SYBR Green I 荧光染料,这两种方法都使反应产物暴露于空气中,既污染了环境,还极易造成假阳性,而且电泳法检测 LAMP 反应产物并不能实时反映 LAMP 反应过程。本研究采用实时浊度仪和 HNB 检测,反应完成后不开盖,很好地杜绝了污染,有效防止了假阳性。但此次研究主要是对金黄色葡萄球菌 DNA 进行 LAMP 扩增,没有使用 LAMP 对临床标本进行检测,有待开展进一步的实验对临床标本进行研究。

总之,LAMP 方法虽然扩增原理复杂,但其操作简便、用时少、灵敏度高、特异性强,再加上不需要复杂的仪器设备,能够很好地满足基层实验室、应急检测或现场检测等方面的使用需求,有望成为简易的常规检测手段。

参考文献

- [1] Khan S, Rasheed F, Zahra R. Genetic polymorphism of agr locus and antibiotic resistance of *Staphylococcus aureus* at two hospitals in Pakistan[J]. Pak J Med Sci, 2014, 30(1): 172-176.
- [2] Morell EA, Balkin DM. Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*: a pervasive pathogen highlights the need for new antimicrobial development [J]. Yale J Biol Med, 2010, 83(4): 223-233.
- [3] Notomi T, Okayama H, Masubuchi H, et al. Loop-mediated isothermal amplification of DNA [J]. Nucleic Acids Res, 2000, 28(12): e63.
- [4] 潘云军, 刘慧, 郭卫红, 等. 医院感染金黄色葡萄球菌的临床特征及耐药性分析[J]. 国际检验医学杂志, 2014, 35(4): 482-484.
- [5] Koide Y, Maeda H, Yamabe K, et al. Rapid detection of *mecA* and *spa* by the loop-mediated isothermal amplification(LAMP) method[J]. Lett Appl Microbiol, 2010, 50(4): 386-392.
- [6] Lim KT, Teh CS, Thong KL. Loop-mediated isothermal amplification assay for the rapid detection of *Staphylococcus aureus*[J]. Biomed Res Int, 2013, 2013: 895816.
- [7] 李文桂, 陈雅棠. 环介导等温扩增技术用于消化道和呼吸道病毒检测的研究进展[J]. 重庆医学, 2014, 43(20): 2662-2665.
- [8] Nie K, Zhang Y, Luo L, et al. Visual detection of human enterovirus 71 subgenotype C4 and coxsackievirus A16 by reverse transcription loop-mediated isothermal amplification with the hydroxynaphthol blue eye[J]. J Virol Method, 2011, 175(2): 283-286.
- [9] Ma XJ, Shu YL, Nie K, et al. Visual detection of pandemic influenza A H1N1 virus 2009 by reverse-transcription loop-mediated isothermal amplification with hydroxynaphthol blue dye[J]. J Virol Method, 2010, 167(2): 214-217.
- [10] 李永刚, 王德国, 武建刚, 等. 环介导恒温扩增法(LAMP)检测金黄色葡萄球菌[J]. 食品工业科技, 2010, 31(1): 388-391.
- [11] Su J, Liu X, Cui H, et al. Rapid and simple detection of methicillin-resistance *Staphylococcus aureus* by *orfX* loop-mediated isothermal amplification assay [J]. BMC Biotechnol, 2014, 14(1): 8.
- [12] Zhao XH, Park MS, Zhang YH. Loop-mediated isothermal amplification assay targeting the *femA* gene for rapid detection of *Staphylococcus aureus* from clinical and food samples[J]. J Microbiol Biotechnol, 2013, 23(2): 246-250.