Dermokine- β mRNA 在结肠癌组织中的水平及临床意义*

付汉东¹, 张爱华², 刘汉忠³, 袁岸龙⁴, 魏 威¹ (湖北省孝感孝感市中心医院/华中科技大学同济医学院附属孝感医院: 1. 中心实验室; 2. 普外科; 3. 病理科; 4. 消化内科, 湖北孝感 432000)

【摘要】 目的 研究 Dermokine(DK)- β mRNA 在结肠癌组织中的水平和临床价值。**方法** 采用 RT-PCR 法检测 DK- β mRNA 相对水平, 对结肠癌患者、结肠息肉、溃疡性结肠炎患者以及健康对照组 DK- β mRNA 相对水平进行比较, 对结肠癌不同临床参数间 DK- β mRNA 相对水平进行比较, 并进行统计学分析。**结果** 结肠癌患者 DK- β mRNA 表达比结肠息肉、溃疡性结肠炎患者以及健康对照组明显升高, 差异有统计学意义 ($P < 0.01$); 但与患者年龄、性别、肿瘤的位置、大小无相关性, 在低分化腺癌、Dukes 分期 B 期、有淋巴结转移的患者中 DK- β mRNA 表达更明显 ($P < 0.05$)。**结论** 结肠癌 DK- β 表达与结肠癌患者黏膜上皮细胞受损密切相关, B 期 DK- β 表达呈显著升高, 因此结肠组织 DK- β 水平检测可作为结肠癌早期诊断的指标, 对临床结肠癌早期诊断有一定价值。

【关键词】 结肠癌; DK- β ; mRNA

DOI: 10.3969/j.issn.1672-9455.2015.21.003 文献标志码: A 文章编号: 1672-9455(2015)21-3137-03

Level of Dermokine- β mRNA in colon cancer tissue and its clinical significance* FU Han-dong¹, ZHANG Ai-hua², LIU Han-zhong³, YUAN An-long⁴, WEI Wei¹ (1. Central Laboratory; 2. Department of General Surgery; 3. Department of Pathology; 4. Department of Gastroenterology, Xiaogan Municipal Central Hospital/Affiliated Xiaogan Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Sciences and Technology, Xiaogan, Hubei 432000, China)

【Abstract】 Objective To investigate the level of dermokine- β (DK- β) mRNA in colon cancer tissue and its clinical value. **Methods** The RT-PCR method was used to detect DK- β mRNA relative level. The DK- β mRNA relative levels were compared among the patients with colon cancer, colonic polyps and ulcerative colitis and normal control group. The DK- β mRNA relative levels were compared among different clinical parameters in colon carcinoma. The statistical analysis was performed. **Results** The expression of DK- β mRNA in the patients with colon cancer was significantly higher than that in the patients with colon polyps, ulcerative colitis and normal control group, the difference was statistically significant ($P < 0.01$). But the DK- β mRNA expression had no correlation with age, gender, tumor location and size. The DK- β mRNA expression in the low differentiation adenocarcinoma, Dukes B stage and lymph node metastasis was more significant ($P < 0.05$). **Conclusion** The DK- β expression in colon cancer is closely associated with mucosal epithelial cell damage. The DK- β expression in the stage B is significantly increased. Therefore, the DK- β level detection in colon tissue may be used as an index of early diagnosis of colon cancer, which has a certain value for early diagnosis of colon cancer.

【Key words】 colon cancer; dermokine- β ; mRNA

结肠癌是常见的消化道恶性肿瘤,在我国已成为发病率上升最快的恶性肿瘤之一^[1],由于目前结肠癌的早期诊断水平较低,约 1/3 的患者明确诊断时疾病已处于进展期^[2],因此结肠癌的延误诊断是影响诊断和预后的重要原因^[3]。Dermokine (DK)是结肠上皮细胞角化后分泌的一种多肽,主要是缩氨酸,目前研究显示 DK 至少有 13 种不同的亚型^[4],其中 DK- β 在早期结肠癌患者血清中的水平是呈显著升高的^[5]。作者通过检测结肠癌组织中 DK- β mRNA 的相对水平变化来研究 DK- β 对国内人群早期结肠癌诊断的价值。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择 2013 年 1~9 月在本院住院治疗的结肠

癌患者 30 例,其中男 18 例,女 12 例;年龄 26~81 岁,参照文献^[6]按年龄分:≥60 岁的老年患者 14 例,41~59 岁的中年患者 13 例,≤40 岁的青年患者 3 例;以肿瘤大小 5 cm 为临界值^[6](CT 或 MRI 测量直径,多个肿瘤时取直径最大者):≥5 cm 16 例,<5 cm 14 例;肿瘤部位:升结肠癌 11 例,横结肠癌 2 例,降结肠癌 4 例,乙状结肠癌 13 例;淋巴结转移:有 13 例,无 17 例;病理组织学分级:高分化腺癌 4 例,中分化腺癌 12 例,低分化腺癌 11 例,黏液腺癌 3 例,Dukes 分期:A 期 6 例,B 期 12 例,C 期 8 例,D 期 4 例;以上病例均符合病理学结肠癌诊断标准^[7]。同期从门诊和住院结肠息肉和溃疡性结肠炎(UC)患者中各随机抽取 20 例作为对照,每组中男 12 例、女 8 例,年龄

* 基金项目:湖北省自然科学基金项目(2013CFB486);湖北省孝感市科技局基金支持项目(2011XXF042)。

作者简介:付汉东,男,在职研究生,医学硕士,副主任技师,主要从事肿瘤早期诊断和肿瘤标志物研究。

20~67 岁、平均 45.6 岁。同时从同期健康体检人群中抽取 30 例作为健康对照组,其中男 18 例、女 12 例,年龄 18~65 岁、平均 44 岁。

1.2 标本采集 手术取患者肿瘤及周围组织,癌旁正常组织为距肿瘤边缘 5 cm 以上的肠段组织(病理证实肿瘤标本切缘肿瘤细胞残留均为阴性),对照组在肠镜下取结肠息肉和炎症组织,健康对照组在肠镜下取少许结肠组织,快速切取组织,用预冷的 1×PBS 液冲洗。放置于无 RNA 酶的冻存管中,保存于 -86 °C 冰箱中待检。

1.3 试剂与仪器 试剂:反转录试剂盒(美国 Sigma 公司),总 RNA 提取试剂盒(美国 Sigma 公司),β-actin 基因试剂盒(美国 Sigma 公司),琼脂糖(美国 Invitrogen 公司),Taq DNA 聚合酶(上海华美公司),二乙基焦磷酸胺(DEPC),液氮,无水乙醇、氯仿、溴化乙锭等。引物设计如下,DK-β 上游引物:5'-AT-GAAGCCGGCCACTGCCTCTG-3',下游引物:5'-GCAGGC-CAGGTTGCACCCGGG-3',扩增范围 379 bp;β-actin 上游引物:5'-TCATGAAGTGTGACGTGGACAT-3',下游引物:5'-CTCAGGAGGAGCAATGATCTTG-3',扩增范围 158 bp(郑州美博公司)。仪器:TC9600-G-230V 型 MultiGene 梯度 PCR 仪(美国 Labnet 公司),DYCZ-21 型电泳仪(北京六一仪器厂),Tanon-3500 凝胶成像分析系统(上海天能公司),TG328 型电子天平(上海上天公司),TGL-16M 高速低温离心机(湖南湘仪公司),YQ-3 型电动匀浆机(华城开元实验仪器厂),移液器(芬兰 Biohit 公司)等。检测中所有操作严格按试剂和仪器说明书要求进行。

1.4 组织 RNA 提取 用 Trizol 法提取组织中的总 RNA, RNA 的提取、完整性、纯度及浓度检测操作程序严格按试剂盒说明书要求进行,经质量检测 RNA 的完整性、纯度及浓度均符合要求后方可扩增。

1.5 扩增和电泳 反应体系 I:Rnasin 1 μL,RT-PCR 缓冲液 4 μL,10 mmol/L dNTP 2 μL,反转录酶 1 μL,OligodT 1 μL, RNA 4 μL,加无 RNase 灭菌蒸馏水至 20 μL。把反应体系 I 放在 PCR 仪反应孔中,设置反应模式。循环模式:37 °C 反转录 60 min,得到 cDNA。反应体系 II:RT-PCR 缓冲液 2 μL, dNTPs 1 μL,上游引物 1 μL,下游引物 1 μL,Taq 酶 1.5 U, cDNA 2 μL,PCRTye 2 μL,加无 RNase 灭菌蒸馏水至 20 μL。循环模式:94 °C 预变性 5 min,94 °C 45 s,60 °C 45 s,72 °C 30 s,循环 40 次,72 °C 延伸 10 min,4 °C 保存待凝胶电泳检测。电泳:将 6 μL 扩增产物与 2 μL 溴酚蓝上样缓冲液混合,在 1.5% 的琼脂糖凝胶中进行电泳,恒压 80 V,30 min 后,用凝胶成像系统观察结果。

1.6 结果判断标准 凝胶成像仪观察结果,进行面积灰度扫描,DK-β mRNA 相对表达量 A 值 = DK-β mRNA 产物的吸光度 A 值(OD)/β-actin 产物的吸光度 A 值(OD)。

1.7 统计学处理 采用 SPSS13.0 统计软件包进行统计分析,计量资料用 $\bar{x} \pm s$ 表示,多组间比较采用方差分析,两组间比较用 *t* 检验,以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 各组 DK-β mRNA 相对水平 结肠癌患者 DK-β mRNA 相对水平为 0.82 ± 0.46 ,比结肠息肉(0.34 ± 0.16)、溃疡性结

肠炎(0.29 ± 0.18)、健康对照组(0.14 ± 0.11)均明显升高,差异有统计学意义($P < 0.01$);结肠息肉与溃疡性结肠炎间 DK-β mRNA 相对水平无明显差异,但均比健康对照组高($P < 0.05$)。

2.2 DK-β mRNA 相对水平与结肠癌患者临床病理参数的关系 见表 1。DK-β mRNA 的表达与患者年龄、性别、肿瘤的位置与大小无关,在不同组织学分级中低分化腺癌 DK-β mRNA 表达更明显($P < 0.05$),不同 Dukes 分期中 B 期表达更明显($P < 0.05$),有淋巴结转移的比无淋巴结转移表达更明显($P < 0.01$)。

表 1 DK-β mRNA 相对水平与结肠癌患者临床病理参数的关系

临床病理参数	n	DK-β mRNA 相对水平($\bar{x} \pm s$)	t/F	P
性别	男	18 0.84±0.30	0.13	>0.05
	女	12 0.79±0.28		
年龄	老年	14 0.86±0.31	0.76	>0.05
	中年	13 0.77±0.24		
	青年	3 0.74±0.26		
肿瘤大小(cm)	≥5	16 0.87±0.34	0.36	>0.05
	<5	14 0.77±0.28		
肿瘤部位	升结肠	11 0.78±0.23	0.58	>0.05
	横结肠	2 0.76±0.25		
	降结肠	4 0.84±0.27		
	乙状结肠	13 0.80±0.31		
组织学分级	高分化腺癌	4 0.64±0.29	6.72	<0.05
	中分化腺癌	12 0.82±0.32		
	低分化腺癌	11 1.03±0.43		
	黏液腺癌	3 0.71±0.05		
Dukes 分期	A 期	6 0.76±0.29	6.16	<0.05
	B 期	12 1.06±0.39		
	C 期	8 0.65±0.27		
	D 期	4 0.82±0.35		
淋巴结转移	无	16 0.62±0.24	2.94	<0.01
	有	14 0.91±0.30		

3 讨 论

目前研究显示 DK 位于人类染色体 19q13.12 上,是由一定数量的表皮特异基因组成^[8]。DK 至少有 13 种亚型,可编码 10 多种不同的蛋白质,其中 β 型(相对分子质量 45×10^3)拥有自己的启动子,并在表皮细胞上表达,DK-β 是以高度分化的上皮细胞层分泌的形式表达的^[4]。炎症条件下相关组织的上皮细胞的 DK 基因表达是有差异的,这种差异性也促进炎症状态的差异性^[9]。研究表明在上皮细胞层广泛受损中存在 DK-β 的高水平表达^[10]。

本研究显示结肠癌患者 DK-β mRNA 相对水平均比结肠息肉、溃疡性结肠炎、健康对照组明显升高($P < 0.01$)。结肠黏膜上皮细胞是通过细胞桥粒连接呈相互嵌合紧密排列的,其

间隙由膜被颗粒排出物充填,使结肠黏膜具有独特的生物学特性^[11],结肠黏膜上皮受到损伤可形成溃疡性结肠炎,导致黏膜上皮细胞角化,黏膜组织发生异型增生,同时溃疡性结肠炎中炎症上皮细胞 Bcl-2 表达增高,炎症细胞凋亡停止或减慢,造成溃疡性结肠炎中大量炎症细胞浸润肠壁和持续活化^[12],从结肠息肉、溃疡性结肠炎发展到结肠癌,是一个长期的过程,在早期发生 APC 基因突变,中期发生 ras 基因突变,晚期发生 p53 突变,最终导致癌变^[13],在此过程中伴有黏膜组织的异型增生和炎症的长期存在,导致结肠黏膜上皮细胞层长期广泛受损,DK-β 表达也逐渐升高。由于 NF-κB、肿瘤坏死因子-α (TNF-α)、γ-干扰素(INF-γ)和一氧化氮合酶(iNOS)^[14]等在炎症黏膜中表达显著升高,这些导致黏膜上皮细胞角化和增生、异生加剧;角化细胞衰老、凋亡的调控受干扰素、APC 基因、ras 基因信号通路的调控,当 APC 基因和(或)ras 基因发生突变时 APC 基因、ras 基因信号通路受到影响,这种调控机制可能被打破,从而导致角化的黏膜上皮细胞分泌 DK-β 增加,这也是结肠癌患者 DK-β mRNA 相对水平比对照组都要高的原因,在低分化腺癌、Dukes 分期 B 期、有淋巴结转移的患者中表达更明显($P < 0.05$),同时早期结肠癌患者血清 DK-β 水平显著升高^[15],这由于癌细胞对周围组织浸润,导致结肠局部黏膜上皮细胞层广泛受损,并使淋巴结转移的黏膜上皮细胞层受损,从而引起 DK-β 表达水平显著升高^[5],并大量聚集在病变周围组织,但与患者年龄、性别、肿瘤的位置及大小无关。结肠息肉与溃疡性结肠炎间 DK-β mRNA 相对水平无明显差异,但它们比健康对照组要高($P < 0.05$),是由于炎症局部黏膜上皮细胞层受损导致 DK-β 表达轻度升高,但升高幅度较结肠癌低得多。

DK-β mRNA 在结肠癌早期和进展期表达是显著升高的,因此组织中 DK-β 水平检测对结肠癌的早期诊断和治疗有重要意义。

参考文献

[1] Xu AG, Yu ZJ, Jiang B, et al. Colorectal cancer in Guangdong Province of China; a demographic and anatomic survey[J]. World J Gastroenterol, 2010, 16(8): 960-965.
 [2] Onouchi S, Matsushita H. New method for colorectal cancer diagnosis Based on SSCP analysis of DNA from exfoliated colonocytes in naturally Evacuated feces[J]. Anticancer Res, 2008, 28(1): 145-150.
 [3] Hewitson P, Glasziou P, Irwig L, et al. Screening for colorectal cancer using the faecal occult blood test, Hemoccult[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2007, 24(1): CD001216.
 [4] Moffat P, Salois P, St-Amant N, et al. Identification of a

conserved cluster of skin-specific genes encoding secreted proteins[J]. Gene, 2004, 33(4): 123-131.
 [5] 付汉东,张爱华,刘汉忠,等. Dermokine-β 在结肠癌患组织中的表达及临床意义[J]. 国际检验医学杂志, 2013, 34(18): 2353-2357.
 [6] 翟志伟,顾晋. 肿瘤大小对结肠癌患者预后的影响[J]. 中华胃肠外科杂志, 2012, 15(5): 495-497.
 [7] 陆再英,钟南山. 内科学[M]. 7 版. 北京:人民卫生出版社, 2009: 420-421.
 [8] Matsui T, Hayashi-Kimumi F, Kinoshita Y, et al. Identification of novel keratinocyte-secreted peptides dermokine-β/γ and a new stratified epithelium-secreted protein gene complex on human chromosome 19q13. 12[J]. Genomics, 2004, 84(1): 384-397.
 [9] Naso MF, Liang BL. Dermokine: An Extensively Differentially Spliced Gene Expressed in Epithelial Cells [J]. J Inves Dermatology, 2007, 12(7): 1622-1631.
 [10] Toulza E, Galliano MF, Jonca N, et al. The human dermokine gene: description of novel isoforms with different tissue-specific expression and subcellular location [J]. J Inves Dermatology, 2006, 126(2): 503-506.
 [11] Nagtegaal ID, vande Velde CJ, vander Worp E, et al. Macroscopic evaluation of rectal cancer resection specimen; clinical significance of the pathologist in quality control [J]. J Clin Oncol, 2002, 20(7): 1729-1734.
 [12] Leal RF, Ayrizono Mde L, Milanski M, et al. Detection of epithelial apoptosis in pelvicileal pouches for ulcerative colitis and familial adenomatous polyposis [J]. J Transl Med, 2010, 8(11): 8-11.
 [13] Kumar A, Takada Y, Boriek AM, et al. Nuclear factor-kappaB: Its role in health and disease [J]. J Mol Med, 2004, 82(4): 434-448.
 [14] Stallmach A, Giese T, Schmidt C, et al. Cytokine/chemokine transcript profiles reflect mucosal inflammation in Crohn's disease [J]. Int J Colorectal Dis, 2004, 19(3): 308-315.
 [15] 付汉东,张爱华,袁岸龙,等. 结肠癌患者血清 Dermokine-β 检测方法的建立及临床意义[J]. 国际检验医学杂志, 2012, 33(2): 307-312.

(收稿日期: 2015-01-02 修回日期: 2015-08-31)