· 论 著 ·

miRNA let-7a 和 miRNA let-7f 早期诊断肝癌的临床价值*

刘旭斌¹, 余德奎^{1△}, 邹汉良¹, 杨娟¹, 陶绪雄², 李杰³

(1. 广东省深圳市坪山新区妇幼保健院普外科 518122; 2. 广东省深圳市龙岗中心医院 518100; 3. 武汉大学公共卫生学院, 武汉 430070)

摘要:目的 探讨原发性肝癌患者 miRNA let-7a、miRNA let-7f 的表达。方法 收集龙岗中心医院及合作医院 2014 年 6 月至 2016 年 3 月接受肝癌切除手术的 40 例原发性肝癌患者。采用 RT-PCR 方法检测 miRNA let-7a、miRNA let-7f 在血清、肝癌/癌旁组织中的表达水平。选择同期该院体检的 40 例健康者作为健康对照者。比较肝癌患者和健康对照者血清 miRNA let-7a、let-7f 的表达差异。结果 肝癌癌变组织 miRNA let-7a $[(0.18 \pm 0.04) \times 10^3]$ 、miRNA let-7f $[(0.19 \pm 0.01) \times 10^3]$ 分别较癌旁组织 $[(1.52 \pm 0.11) \times 10^3$ 、 $(0.67 \pm 0.10) \times 10^3]$ 低, 差异有统计学意义($P < 0.01$); 肝癌患者血清 miRNA let-7a $[(0.22 \pm 0.06) \times 10^3]$ 、miRNA let-7f $[(0.15 \pm 0.04) \times 10^3]$ 较健康对照者 $[(1.13 \pm 0.21) \times 10^3$ 、 $(0.62 \pm 0.12) \times 10^3]$ 低, 差异有统计学意义($P < 0.01$)。结论 miRNA let-7a、miRNA let-7f 在肝癌患者病变组织及血清中异常偏低表达, 可作为早期诊断肝癌的重要标志物, 为临床诊断提供参考。

关键词: 肝癌; miRNA let-7a; miRNA let-7f

DOI: 10.3969/j.issn.1672-9455.2017.14.005 **文献标志码:** A **文章编号:** 1672-9455(2017)14-2017-03

The expression of miRNA let-7a and miRNA let-7f in primary liver cancer patients*

LIU Xubin¹, YU Dekui^{1△}, ZOU Hanliang¹, YANG Juan¹, TAO Xuxiong², LI Jie³

(1. Department of General Surgery, Shenzhen Pingshan New District Women and Child Health Hospital, Shenzhen, Guangdong 518122, China; 2. Longgang Central Hospital of Shenzhen, Shenzhen, Guangdong 518100, China; 3. School of Public Health, Wuhan University, Wuhan, Hubei 430070, China)

Abstract: **Objective** To study the expression of miRNA let-7a and let-7f in primary liver cancer patients. **Methods** In our hospital from June 2014 to March 2016, 40 patients with primary liver cancer were selected. the expression levels of miRNA let-7a and let-7f in serum and liver cancer/tumor adjacent tissues were detected by RT-PCR methods. A total of 40 healthy volunteers were selected at the same time and expression of miRNA let-7a, let-7f in serum were analyzed. **Results** The miRNA in cancer tissues [let-7a $(0.18 \pm 0.04) \times 10^3$, let-7f $(0.19 \pm 0.01) \times 10^3$] were lower than those in the adjacent tissues [let-7a $(1.52 \pm 0.11) \times 10^3$, let-7f $(0.67 \pm 0.10) \times 10^3$]. The difference was statistically significant ($P < 0.01$); In primary liver cancer, the level of miRNA let-7a $[(0.22 \pm 0.06) \times 10^3$, let-7f $(0.15 \pm 0.04) \times 10^3]$ were lower than those in normal healthy people $[(1.13 \pm 0.21) \times 10^3$, $(0.62 \pm 0.12) \times 10^3]$, the difference was statistically significant ($P < 0.01$). **Conclusion** miRNA let-7a, miRNA let-7f are abnormally low expression in the tissue and the serum of primary liver cancer patients.

Key words: primary liver cancer; miRNA let-7a; miRNA let-7f

肝癌是我国最常见的恶性肿瘤类型之一, 男性多于女性, 具有发病率高、病死率高等特点, 早期及时确诊是指导临床治疗、改善患者预后的关键。肝癌患者早期症状不明显或缺乏特异性, 仅凭肝区疼痛、全身或消化道等症状难以确诊, 传统检查手段如血清标志物甲胎蛋白(AFP)检测、影像学检查等均存在一定的漏诊、误诊, 且确诊时大多数患者已是中晚期, 临床治疗效果欠佳, 预后较差^[1]。近年来 miRNA 在肝癌发病机制中的作用逐渐引起关注, 国内外研究已明确 miRNA let-7 与肝癌的发生、发展密切相关^[2-3]。但现有研究报道多数是关于 let-7 家族与肝癌细胞之间的关系, 对 let-7 家族中 miRNA 的单个种类的研究不足, 特别是针对 let-7f 的研究欠缺。动物试验表明 miRNA let-7a、miRNA let-7f、miR-98 等在大鼠早期肝癌中异常表达。现通过患者肝癌病变组织与癌旁组织; 肝癌患者与健康

对照者各指标水平的比较, 探讨 miRNA let-7a、miRNA let-7f 在早期肝癌诊断中的临床价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取龙岗中心医院及合作医院 2014 年 6 月至 2016 年 3 月行肝癌切除手术的 40 例原发性肝癌患者。纳入标准: (1) 均结合临床常规检查结果、手术病理结果等确诊。(2) 年龄小于或等于 70 岁。(3) 入院前未接受其他放、化疗或生物免疫治疗等。(4) 签署知情同意书。排除标准: (1) 合并心、肺、肾等器质性病变或其他恶性肿瘤者。(2) 精神意识障碍者。男 29 例, 女 11 例; 年龄 35~69 岁, 平均年龄 (53.1 ± 6.2) 岁; 入院时 AFP 为 15.7~627.3 ng/mL, 平均 (90.4 ± 10.7) ng/mL。选取同期该院体检的 40 例健康者作为健康对照者, 男 31 例, 女 9 例; 年龄 32~70 岁, 平均年龄 (53.5 ± 6.4) 岁。

* 基金项目: 广东省深圳市科技计划资助项目(JCYJ20140415114640316)。

作者简介: 刘旭斌, 男, 副主任医师, 主要从事普通外科研究。△ 通信作者, E-mail: 2073700930@qq.com。

本研究经该院伦理委员会审核批准,且肝癌患者和健康对照者的性别、年龄等一般资料比较,差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 血液标本及处理 肝癌患者手术前和健康对照者均抽取空腹静脉血 5 mL, 15~25 °C 静置 60~120 min, 血液凝固后常规离心 1 500 r/min, 10 min 并提取上清液, 标本装入去核糖核酸酶(RNase)的 EP 管中, -60 °C 冷存以备检测。按照 1:1 的比例在血清标本中加入 Trizol 试剂, 充分混匀后用苯酚/氯仿仿做去蛋白处理, 将乙醇沉淀的 RNA 成分加入 DEPC 水中溶解, 采用紫外分光光度法检测所提取的 RNA 纯度, 检测后将提取的 RNA 低温保存。

1.2.2 组织标本及处理 肝癌患者手术采集肝癌病变组织和癌旁组织, 其中癌旁组织切取范围为距离癌灶边缘约 3 cm 以内, 标本即刻低温 -60 °C 保存。分别取 0.1 g 组织标本放入预冷的研钵中, 加入适量液氮磨成粉末, 待标本中液氮挥发后加入约 3 mL 的 Trizol 试剂, 4 °C 下 8 000 r/min 离心, 5 min 后, 获取上清液至 EP 试管中并加入 200 μL 氯仿, 充分振荡混匀 30 s 以确保有机相、水相充分接触。15~25 °C 静置 15~20 min 后 4 °C 下 8 000 r/min 离心, 5 min, 其中水相部分置于 0.5 mL 异丙醇的去 RNase 的 EP 管中, 常规离心弃上清液后加入 DEPC 水溶解。采用紫外分光光度法提取总 RNA, OD260/OD280 比值大于或等于 1.8, 检测提取的 RNA 低温保存。

1.2.3 合成 cDNA 严格按照 TAKARA 反转录试剂盒说明书进行操作, RT 反应体系的配置在去 RNase 的 PCR 管中进行, 将提取的总 RNA 浓度进行适当调整, RT 反应体系充分混匀后 40 °C 孵育反转录 60 min, 90 °C 孵育 10 min 灭活反转录酶。

1.2.4 荧光定量 PCR 检测 取适量 cDNA 置于去 RNase 的 PCR 试管中, 内侧基因为 β-actin, 根据试剂盒说明书加入上下游引物, 2 μL 通用引物、2 μL 的 let-7a 和 let-7f 目的引物、4 μL 的无酶水和 2×SYBR Green PCR Master MiX, 建立 20 μL 的反应体系。反应相关参数设置: 预变性 95 °C, 15 min, 共 40 个循环; 变性 95 °C, 30 s, 退火 56 °C, 20 s, 延伸 72 °C, 40 s, 观察并收集荧光信号。

1.2.5 数据分析 根据 cDNA 浓度梯度的 log 值作 ΔCT 值图, 采用实时荧光定量 Real-time PCR 相对定量法检测组织和血清标本的 miRNA let-7a、let-7f 水平。以 U6 表达量为内参, miRNA let-7a、let-7f 用 $2^{-\Delta\Delta CT}$ 表示, 其中 CT 值表示每个 PCR 管内的荧光信号到达设定阈值期间所经历的循环数, $\Delta CT =$ 检测值平均 CT - U6 平均 CT, $\Delta\Delta CT =$ 待检测标本 ΔCT - 校准标本 ΔCT 。

1.3 统计学处理 采用 SPSS19.0 统计软件进行数据分析, 使用 EpiData3. 软件行双份录入, 利用人工和计算机对数据进行再次核查确保数据的客观、准确性, 纠正逻辑错误和锁定数据集。肝癌患者组织、血清标本 miRNA let-7a、let-7f 为计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示, 组间比较行 *t* 检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 2 种组织标本检测结果比较 肝癌患者病变组织标本 miRNA let-7a、let-7f 分别低于癌旁组织, 差异均有统计学意义

($P < 0.05$)。见表 1 和图 1、2。

表 1 2 种组织标本检测结果比较 ($\times 10^3, \bar{x} \pm s$)

组织类型	例数(n)	miRNA let-7a	miRNA let-7f
病变组织	40	0.18 ± 0.04	0.19 ± 0.01
癌旁组织	40	1.52 ± 0.11	0.67 ± 0.10
<i>t</i>		72.406	30.207
<i>P</i>		<0.01	<0.01

表 2 肝癌患者与健康对照者血清标本检测结果比较 ($\times 10^3, \bar{x} \pm s$)

类别	例数(n)	miRNA let-7a	miRNA let-7f
肝癌患者	40	0.22 ± 0.06	0.15 ± 0.04
健康对照者	40	1.13 ± 0.21	0.62 ± 0.12
<i>t</i>		26.352	23.5
<i>P</i>		<0.01	<0.01

图 1 癌变组织 miRNA let-7a PCR

图 2 癌变组织 miRNA let-7f PCR

图 3 肝癌患者血清 miRNA let-7a PCR

图 4 肝癌患者血清 miRNA let-7f PCR

2.2 肝癌患者与健康对照者血清标本检测结果比较 患者血清 miRNA let-7a、let-7f 分别低于健康对照者, 差异均有统计学意义 ($P < 0.05$)。见表 2 和图 3、4。

3 讨论

我国乙型肝炎病毒相关性肝癌的发病率和病死率均较高, 且呈上升趋势。目前治疗肝癌的手段较多, 如外科切除术, 经皮肿瘤清除和肝移植治疗, 热疗等, 但对化疗不敏感, 因确诊的延误和肿瘤转移扩散, 导致部分患者临床治疗效果不满意, 复发率和病死率仍较高^[4]。miRNA 是近年来发现的一种具有调节作用的内源性单链小分子 RNA, 长度约为 20~22 个核苷酸, 在真核生物中广泛分布。目前经鉴定的人类 miRNA 高达 700 余种, 其广泛的分布性和稳定特异性的表达对参与调节人体细胞代谢、增殖、凋亡、分化、发育具有重要的影响^[5]。多数学者认为 miRNA 相关表达调控机制可能是通过改变处理酶和启动子超甲基化等实现^[6]。

目前 miRNA 具有致癌基因和肿瘤抑制基因的作用已被普遍认可, 有研究探讨子宫内腺癌组织和正常内膜组织的 miRNA 表达谱及差异, 发现共有 18 个 miRNA 在子宫内腺癌组织中呈异常上调表达, 31 个 miRNA 呈明显下调表达等, 可作为临床区分不同分化子宫内腺癌的重要生物标志物^[7]。国外研究报道, 结缔组织生长因子 (CTGF) 和核因子 NF- κ B 受体活化因子配体 (RANKL) 是 miR-18 的靶基因, 提示肝癌的发生、进展与 miRNA 紧密相关^[8]。

本研究认为: (1) 目前对 let-7 家族中 miRNA 的单个种类研究较少。 (2) let-7 家族作为最早发现的一类 miRNA, 主要包括 let-7a、let-7f、let-7i、miRNA-98 等 13 个成员, 随着 miRNA 对肝癌生物和分子功能研究的逐渐加深, let-7 家族成为关注的热点。本研究结果显示, 肝癌患者病变组织 miRNA let-7a、let-7f 水平分别为 $(0.18 \pm 0.04) \times 10^3$ 、 $(0.19 \pm 0.01) \times 10^3$, 均明显低于癌旁组织表达 ($P < 0.01$); 且肝癌患者血清 miRNA let-7a、let-7f 水平也低于健康对照者 ($P < 0.01$), 提示肝癌发病和 miRNA let-7a、let-7f 的表达高度相关, 血清检测水平偏低预示肝癌的可能。有研究报道, microRNA let-7a 可通过下调

CD133⁺ Huh7 肝癌干细胞内的 wnt/ β -catenin 信号通路的转录活性, 从而达到抑制肝癌干细胞增殖和转移的靶向功能^[9]。还有研究表明, let-7 对肝癌高迁移率族蛋白 A2 癌基因也具有抑制作用^[10]。本研究认为 miRNA let-7a、miRNA let-7f 在肝癌患者中呈异常下调表达, 肿瘤细胞基因的靶向调控功能失调是引起肝癌的重要机制, 高敏感性指标 miRNA let-7a、miRNA let-7f 可作为早期诊断的重要标志物。

综上所述, miRNA 表达和肝癌发病密切相关, miRNA let-7a、miRNA let-7f 水平在病理组织和血清标本中均明显下调, 早期加强血清相关指标检测, 对早期诊断、指导临床治疗、改善预后具有重要的临床意义。

参考文献

- [1] 朱明月, 李孟森. 甲胎蛋白: 治疗肝癌的新靶点[J]. 海南医学, 2014, 25(1): 1-4.
- [2] Nagano T, Higashisaka K, Kunieda A, et al. Liver-specific microRNAs as biomarkers of nanomaterial-induced liver damage[J]. Nanotechnology, 2013, 24(40): 405-409.
- [3] 占美晓, 李勇, 胡宝山, 等. 肝癌患者血清中微小 RNA 的表达及其临床意义[J]. 中华医学杂志, 2013, 93(23): 1830-1832.
- [4] 梁安林, 李灼日, 周开伦, 等. 肝癌的热疗方法与新进展[J]. 海南医学, 2013, 24(12): 1789-1792.
- [5] 王攀, 谢放文, 范钦桥, 等. miR-139-5p 靶向转化生长因子- β 1 抑制肝癌细胞侵袭转移的机制[J]. 中华肝胆外科杂志, 2016, 22(1): 17-23.
- [6] 周超, 曹虹, 饶雪峰, 等. 正常上皮细胞特异性-1 基因超甲基化在肝癌发病机制中的作用[J]. 中华肝胆外科杂志, 2016, 22(6): 402-406.
- [7] 梁静, 张贵宇, 马本红, 等. 子宫内腺癌组织中 miRNA 差异表达谱分析[J]. 山东大学学报(医学版), 2011, 49(8): 90-95.
- [8] Koturbash IJ. Role of epigenetic and miR-22 and miR-29b alterations in the downregulation of Mat1a and Mthfr genes in early preneoplastic livers in rats induced by 2-acetylaminofluorene[J]. Mol Carcinog, 2013, 52(4): 318-327.
- [9] 陈斌, 沈顺利, 彭宝岗. 微小 RNA let-7a 对 CD133⁺ 肝癌干细胞增殖和转移的影响[J/CD]. 中华细胞与干细胞杂志(电子版), 2015, 5(3): 44-47.
- [10] 傅孝媛, 张献全. 高迁移率族蛋白 A2 基因与肿瘤关系的研究进展[J]. 重庆医学, 2016, 45(14): 1992-1995.

(收稿日期: 2017-01-17 修回日期: 2017-02-25)

医学统计工作的基本内容

按工作性质及其先后顺序, 可将医学统计工作分为实验设计、收集资料、整理资料、分析资料。实验设计是开展某项医学研究工作的关键, 包括医学专业设计和统计学设计, 医学专业设计的内容包括研究对象纳入和排除标准、样本含量、获取样本的方法、分组原则、观察(检测)指标、统计方法等。收集资料的方法包括各种试验、检测或调查, 要求资料完整、准确、及时、有足够数量、具有代表性和可比性等。整理资料包括原始资料的检查与核对、对资料进行分组与汇总等。分析资料即对资料进行统计学分析, 包括进行统计描述和统计推断。